

## Φακελίσκοι

### 1. Περιγραφή, σύνθεση και χρήση του Femannose<sup>®</sup> N

#### 1.1. Μηχανισμός δράσης

Η κυστίτιδα (φλεγμονή της ουροδόχου κύστης) και οι συνδεδεμένες καταστάσεις είναι μικροβιακές ασθένειες που επηρεάζουν κυρίως την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οφείλονται στην εισβολή μη παθογόνων βακτηρίων της μικροχλωρίδας του κατώτερου γαστρεντερικού σωλήνα, εάν τα βακτήρια αυτά εντοπίσουν συνθήκες που επιτρέπουν την προσκόλληση και ανάπτυξη στο τοίχωμα της ουροδόχου κύστης και στην ουροποιητική οδό.

Αυτές οι καταστάσεις εμφανίζονται συχνότερα σε νεαρές γυναίκες, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια της περιεμμηνόπαυσης και της μετεμμηνόπαυσης, αλλά μερικές φορές επίσης σε ηλικιωμένους άνδρες ή σε καθετηριασμένους ασθενείς.

Η φαρμακολογική θεραπεία πρώτης εκλογής για την κυστίτιδα είναι επί του παρόντος η χορήγηση αντιβιοτικών. Ωστόσο, πολλά βακτήρια είναι ανθεκτικά και μπορούν να οδηγήσουν σε υποτροπή της λοίμωξης.

Το Femannose<sup>®</sup>N είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που ενδείκνυται για τη θεραπεία και την πρόληψη της κυστίτιδας και άλλων μη επιπλεγμένων βακτηριακών λοιμώξεων του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (ΛΟΣ). Η D-μαννόζη μπορεί να καταπραΰνει τα πιο κοινά συμπτώματα των λοιμώξεων του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (τσούξιμο κατά την ούρηση, συχνουρία, επείγουσα ανάγκη για ούρηση κ.λπ.) όταν προκαλούνται από βακτήρια του τύπου *Escherichia coli*.

Η D-μαννόζη είναι ένα επιμερές της γλυκόζης που αποτρέπει αποτελεσματικά την προσκόλληση των παθογόνων στο επιθήλιο του ουροποιητικού συστήματος, αναστέλλοντας έτσι την προσκόλληση των μικροβίων που εισβάλλουν στην ουρογεννητική οδό. Κατ' αυτόν τον τρόπο μειώνεται η μολυσματικότητα ή η ικανότητα προσκόλλησης στους ιστούς του ουροποιητικού συστήματος, το οποίο συμβάλλει στη «μηχανική» πρόληψη της υποτροπής των λοιμώξεων.

Το Femannose<sup>®</sup> N, για την πρόληψη ή τη θεραπεία της κυστίτιδας και άλλων βακτηριακών λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, μπορεί να έχει συνεργική δράση μαζί με αντιβιοτικά, καθώς ο αντιμικροβιακός μηχανισμός δράσης είναι διαφορετικός και δεν αλληλεπικαλύπτεται.

Ιδιαίτερα, το Femannose<sup>®</sup> N με τα συστατικά του δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

#### 1.2 Σύνθεση

Κάθε φακελίσκος περιέχει:

##### D-μαννόζη (2 g)

Έκδοχα: γλυκαντικά: φρουκτόζη, σουκραλόζη-κίτρινο οξύ-χρωστική: ερυθρό τεύτλο-αντισυσωματικός παράγοντας: διοξείδιο του πυριτίου-άρωμα.

## 2. Συσκευασία

Μια συσκευασία περιέχει 14 φακελίσκους των 4,0 g.

## 3. Δοσολογία και οδηγίες για τη χρήση

Για ενήλικες και παιδιά άνω των 14 ετών.

Για τη θεραπεία της οξείας κυστίτιδας συνιστάται η ακόλουθη δοσολογία:

Ημέρα	Ημερήσιος αριθμός φακελίσκων
1η-3η ημέρα	3
4η και 5η ημέρα	2

Η συνιστώμενη δόση για την πρόληψη της κυστίτιδας είναι ένας φακελίσκος ημερησίως.

Η λήψη πρέπει να κατανέμεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συνιστάται να λαμβάνετε το προϊόν μεταξύ των γευμάτων.

Διαλύστε το περιεχόμενο ενός φακελίσκου σε ένα ποτήρι νερό. Συνιστάται να πίνετε τουλάχιστον δύο λίτρα νερό ημερησίως για να προωθήτε τη διούρηση.

Για να αποφευχθεί η υποτροπή της λοίμωξης, η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί για έναν μήνα.

## 4. Ανεπιθύμητες ενέργειες

Ειδικές δοκιμές έχουν καταδείξει ότι τα συστατικά του Femannose<sup>®</sup> N είναι ακίνδυνα, πλήρως βιοσυμβατά και καλώς ανεκτά.

Στη δοσολογία που είναι απαραίτητη για την επίτευξη θεραπευτικού αποτελέσματος, δεν έχει ποτέ καταγραφεί εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών, εκτός από περιπτώσεις ατομικής δυσανεξίας, που θα μπορούσε να προκαλέσει ναυτία, μετεωρισμό και πολτώδεις κενώσεις. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, απευθυνθείτε στον γιατρό σας.

## 5. Αλληλεπιδράσεις με συμπληρώματα διατροφής και φάρμακα

Για τα συστατικά του Femannose<sup>®</sup> N δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις με συμπληρώματα διατροφής.

Ωστόσο, κατά γενικό κανόνα, τα συμπληρώματα διατροφής, συμπεριλαμβανομένων βιταμινών, θρεπτικών ουσιών, φυτικών και ομοιοπαθητικών φαρμάκων, πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον δύο ώρες πριν ή μετά τη χρήση του Femannose<sup>®</sup> N.

Αλληλεπιδράσεις με φάρμακα: Η ταυτόχρονη λήψη του Femannose<sup>®</sup> N δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών.

Η αντιπροσκολλητική δράση της D-μαννόζης δεν οδηγεί σε αυτοχλή.

Η μαννόζη δεν μεταβολίζεται και επομένως δεν επηρεάζει άλλες ουσίες.

## 6. Φύλαξη

Φυλάσσετε το Femannose<sup>®</sup>N σε ξηρό μέρος και προστατευμένο από τη θερμότητα και το φως. Ανοίξτε τον φακελίσκο μόνο αμέσως πριν τη χρήση. Φυλάσσετε το προϊόν σε θερμοκρασία κάτω των 25°C.

## 7. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Χρησιμοποιήστε το Femannose<sup>®</sup> N μόνο αφού συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Το Femannose<sup>®</sup> N δεν αποτελεί υποκατάστατο για τη θεραπεία με αντιβιοτικά λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος.

Μη χρησιμοποιείτε το Femannose<sup>®</sup> N σε περίπτωση γνωστής υπερευαισθησίας όπως αλλεργιών ή δυσανεξίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του προϊόντος.

Η χρήση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού συνιστάται μόνο κατόπιν συμβουλής γιατρού. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία!  
Εάν τα συμπτώματα δεν έχουν βελτιωθεί σημαντικά μετά από τρεις ημέρες, πρέπει να σταματήσετε τη λήψη και να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.  
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.  
Μη λαμβάνετε το Femannose® N για περισσότερο από 30 ημέρες. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, απευθυνθείτε σε έναν γιατρό.  
Κάθε φακελίσκος προορίζεται για μία χρήση και πρέπει να ανοίγεται μόνο αμέσως πριν τη χρήση.

### 8. Ημερομηνία λήξης

Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.  
Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στο προϊόν το οποίο βρίσκεται στην άθικτη συσκευασία του κατά την αποθήκευση.

### 9. Απόρριψη

Τα προϊόντα που έχουν λήξει πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.  
Μην απορρίπτετε το προϊόν και τη συσκευασία του στο περιβάλλον.

Τελευταία αναθεώρηση: Ιανουάριος 2021

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Παρακαλούμε αφιερώστε 5 λεπτά για να συμπληρώσετε την έρευνα στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σαρώστε τον κωδικό QR. Αυτό θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε την ικανοποίησή σας από το προϊόν.

<https://www.siiit-pms.com/femannose-n-gr>



Ανώτερο όριο θερμοκρασίας 25°C



Να μην επαναχρησιμοποιείται



Ιατροτεχνολογικό προϊόν



Ημερομηνία λήξης



Κωδικός παρτίδας



Προσοχή



Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης



vegan



### Παρασκευαστής

S.I.I.T. srl

Via Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

ΙΤΑΛΙΑ

### Διανομέας

**ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.**

9° χλμ. Εθνικής οδού Τρικάλων – Λάρισας,

421 00 Τρίκαλα,

Τηλ. : 24310 83441-2

